




กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

คนท้องต้องระวัง!

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ภัยร้ายจากยุงลาย

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus Disease) มี "ยุงลาย" เป็นพาหะนำโรค สามารถแพร่เชื้อโดยยุงลายที่มีเชื้อไวรัสซิกากัด ตัดจากแม่สู่ลูกในครรภ์ และ ทางเพศสัมพันธ์ **ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันเฉพาะ** ต้องรักษาตามอาการ



อาการ

อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ มีผื่นแดงตามตัว มีไข้ ตาแดง ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ

การป้องกัน

ไม่ให้ถูกยุงกัด นอนในมุ้ง ทายากันยุง
กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยใช้
มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค คือ
เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ

การติดเชื้อไวรัสซิกาในขณะตั้งครรภ์มีความเสี่ยงทำให้ทารก มีภาวะศีรษะเล็ก (microcephaly) พัฒนาการช้า และ เกิดความพิการตั้งแต่กำเนิด

หญิงตั้งครรภ์ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ หากมีอาการป่วย ควรรับการรักษาแพทย์ทันที **ไม่ควรซื้อยาทานเอง** โดยเฉพาะ ยาแอสไพริน และ ยา
กลุ่ม NSAIDs เช่น ไอบูโพรเฟน ไดโคลฟีแนค

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เผยแพร่ : วันที่ 27 กันยายน 2566

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Office of Disease Prevention and Control 7 Khonkaen
www.ddc.moph.go.th/odpc7 โทร. 043-222818-9

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422



Facebook



Youtube



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ยุงลาย

ยุงร้ายนำโรคติดต่อไวรัสซิกา

คนท้อง ต้องระวัง

มีผลกระทบกับทารก

- ศีรษะเล็ก เส้นรอบศีรษะต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
- พิการแต่กำเนิด เช่น มีความผิดปกติระบบประสาท การมองเห็น การได้ยิน ทารกเสียชีวิตในครรภ์



การป้องกัน



หญิงตั้งครรภ์ มีไข้และผื่น ควรไปพบแพทย์ **ห้ามใช้ยาในกลุ่ม NSAIDs โดยเด็ดขาด**



ตรวจครรภ์อย่างสม่ำเสมอ และแจ้งประวัติ หากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือเดินทางไปยังพื้นที่ระบาด



มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยระหว่างตั้งครรภ์



กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันอย่าให้ยุงกัด โดยนอนในมุ้ง ทายากันยุงความเข้มข้น DEET ไม่เกิน 30% เป็นต้น

