



กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control


# โรคอุจจาระร่วง จากเชื้อไวรัส

**โรคอุจจาระร่วง** เป็นภาวะที่พบได้ปอยทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ หมายถึง กลุ่มอาการที่มีการถ่ายอุจจาระเหลวหรือเป็นน้ำ ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป ใน 1 วัน หรือถ่ายอุจจาระเป็นน้ำหรือเป็นน้ำมูกเลือดแมมเพียงครั้งเดียว และอาจมีอาการอาเจียน หรือ เป็นไข้ร่วมด้วย

**โรคอุจจาระร่วง** สามารถแบ่งได้ตามระยะเวลาที่ป่วย เช่น อุจจาระร่วงเฉียบพลัน คือ มีอาการอุจจาระร่วงน้อยกว่า 7 วัน และอุจจาระร่วงเรื้อรัง คือ มีอาการอุจจาระร่วงนานกว่า 7 วัน นอกจากนี้ยังแบ่งตามเชื้อที่เกิดให้เกิดอาการอุจจาระร่วง เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส สารพิษ ลิ่งแผลปลอม เป็นต้น

### **โรคอุจจาระร่วงจากไวรัส**

เชื้อไวรัสส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดอาการอุจจาระร่วง เช่น เชื้อไวรัสโกรตา (Rotavirus), เชื้อไวรัสโนโร (Norovirus)



**โรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโตรตा** พbmaga ในกลุ่มเด็กเล็ก อายุต่ำกว่า 5 ปี แต่ในรอบ 2 ปี ที่ผ่านมา มีพบรายงานการป่วย ในผู้ใหญ่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจติดเชื้อจากการดูแลเด็กที่ป่วย หรือติดจาก การปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม โดยเชื้อไวรัสโตรตามักจะพบมาก ในช่วงฤดูหนาว

**สาเหตุ** เชื้อไวรัสโตราที่ทำให้เกิดอาการอุจจาระร่วงในมนุษย์ มี 7 สายพันธุ์ (A, B, C, D, E, F, G) เด็กที่อายุน้อยกว่า 5 ขวบ เกือบทุกคน จะติดเชื้อไวรัสกลุ่มนี้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง

**อาการ** อาจจะมีไข้ มีน้ำมูกและไอเล็กน้อยมาก่อน คล้ายการติดเชื้อไวรัสอื่น ๆ แต่จะมีอาการชักสั่น ๆ แล้วมีอาการทางเดินอาหารตามมา มักมีอาเจียนมากใน 1 – 2 วันแรก และห้องร่างเป็นน้ำผุ่งหลายครั้ง หากไม่ได้รับการรักษาเพียงพอจะห้องอีกมาก อาจถ่ายอุจจาระมาก จนกันแดง

อาการอาเจียนจะเป็นในช่วงสองวันแรกแล้วดีขึ้น แต่ห้องร่างจะอยู่นานประมาณ 5 – 7 วัน

**การติดเชื้อ** เกิดจากการกินลิ้งปนเปื้อนอุจจาระที่มีเชื้อนี้ เช่น เด็กมีอีเว่นแล้วอมหรือดูดนิ้ว หรือเชื้อ / อุจจาระติดกับของเล่นหรือเครื่องใช้ ดังนั้นจึงมักมีการระบาดของไวรัสโตรตาในโรงเรียนเด็กเล็ก หรือสถานเลี้ยงเด็ก

## การรักษา


ไม่มีการรักษาเฉพาะ เป็นการรักษาตามอาการ เช่น การให้สารน้ำและเกลือแร่ทดแทน ถ้ามีภาวะขาดน้ำ เป็นต้น

## วัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโตรตา

โดยกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคของประเทศต่อไป ทำให้ขณะนี้ยังไม่มีให้บริการในโรงพยาบาลรัฐทั่วไป แต่มีให้บริการแบบมีค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย หรือโรงพยาบาลของรัฐบางแห่ง

## ข้อบ่งใช้วัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโตรตา

ใช้เฉพาะในเด็กเล็ก เป็นวัคซีนชนิดหยดเข้าทางปาก จำนวน 2 หรือ 3 ครั้ง ขึ้นอยู่กับชนิดของวัคซีน อายุที่ให้วัคซีน คือ 2 และ 4 เดือน ถ้าเป็นชนิดหยดสองครั้ง และ 2, 4 และ 6 เดือน สำหรับชนิดหยด 3 ครั้ง โดยวัคซีนสามารถลดการป่วยหรือลดความรุนแรงของโรคได้



## โรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโนโร

เป็นไวรัสในกลุ่มที่ ก่อ “โรคหวัดลงกระเพาะหรือสต็อมมัค พลู (stomach flu)” มักพบในฤดูหนาว พบร้าห์ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่


โรคนี้จะปรากฏอาการของโรคหลังได้รับเชื้อเข้าไปเพียง 24 - 48 ชั่วโมง หรือเกิดอาการได้เร็กว่า่นน อาการที่พบบ่อย ไข้ หนาสัน ปวดศีรษะ ปวดเนื้อปวดตัว อาเจียน ปวดท้องมาก ท้องเสีย อ่อนเพลีย อาการของโรคจะเป็นอยู่ไม่นานเพียงวันสองวันและอาการมักไม่หนักแต่ผู้ป่วยจะมีความรู้สึกว่าไม่สบายมากๆ

สำหรับเด็ก ผู้สูงวัยผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแย้มมีอาการมากกว่า หนุ่มสาว โรคสามารถแพร่ติดต่อกันจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได้โดยง่ายดาย

**การติดเชื้อ** อาจติดโดยเข้าทางการรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ติดจากผู้ป่วยหรือบริการอาหาร ติดจากงาน ชาม ช้อน ผ้าเช็ดอุปกรณ์ อาหารที่ก่อการติดเชื้อบ่อย ได้แก่ หอยนางรมสด ลวก หรือปูรุ่งไม่สุกหัวถึง ผู้ที่ติดเชื้อแล้วจะแพร่เชื้อต่อไปได้อีกประมาณสามวัน

โรคนี้แล้วป่วยได้อีก เพราะไวรัสมีหลายสายพันธุ์จึงติดเชื้อต่างสายพันธุ์ซ้ำอีกได้

โรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโนโร ไม่มีวัคซีนป้องกันโรค และไม่มีวิธีการรักษาโดยเฉพาะ เป็นการรักษาตามอาการเท่านั้น เช่น ให้ดื่มน้ำละลายน้ำตาลเกลือแร่ (โอ อาร์ เอส) เพื่อป้องกันการขาดน้ำ ไม่ควรซื้อยาฆ่าเชื้อกินเอง เพราะโรคเหล่านี้สามารถหายได้เอง



## การป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัส

สามารถป้องกันได้โดย

1. หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หรือเจลล้างมือทั้งก่อนปฐง  
ประกอบอาหาร และหลังการใช้ห้องน้ำ
2. กำจัดขยะมูลฝอย เศษอาหารเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน  
หนู สัตว์กัดแหะ และสัตว์อื่นๆ
3. รับประทานอาหารที่ปฐง “สุก ร้อน สะอาด” และไม่รับประทาน  
อาหารสุกๆ ดิบๆ โดยเฉพาะอาหารที่ปฐงจากเนื้อสัตว์อาหารทะเล
4. ล้างผักและผลไม้ให้สะอาด หลีกเลี่ยงน้ำและอาหารที่ไม่สะอาด
5. ทำความสะอาดอุปกรณ์ ของเล่น และเสื้อผ้าของผู้ป่วย โดยใช้  
น้ำยาทำความสะอาด เชื้อที่มีส่วนผสมของโซเดียมไอก្រคลอไอล์ด เช่น  
ผงฟอกขาว น้ำยาซักผ้าขาว เป็นต้น



อาหาร / น้ำ เลี่ยง  
ต่อโรคอุจจาระร่วง  
จากไวรัส

ถ้ามีอาการอุจจาระร่วงให้ดื่มน้ำละลายน้ำตาลเกลือแร่ (โอ อาร์ เอส) เพื่อป้องกัน  
การขาดน้ำ ไม่ควรซื้อยาผ่าเชื้อกินเอง เพราะ  
โรคเหล่านี้สามารถหายได้เอง หากผู้ป่วย  
อาการไม่ดีขึ้น ยังถ่ายบ่อย อาเจียน อ่อนเพลีย<sup>โดย</sup>โดย  
เฉพาะในเด็กเล็กและผู้สูงอายุขอให้รีบพบ  
แพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน"

สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

กรมควบคุมโรค โทร. 0 2590 3855 หรือ

สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

[www.riskcomthai.org](http://www.riskcomthai.org)



กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control